

簡介

針刺細胞檢驗是一種快捷簡便和安全的細胞檢驗方法，能對各種病變作出有效的診斷。

手術過程

這方法適用於門診或住院病人。病理科醫生會用一枝幼細的針在病人的身上可觸摸之硬塊的位置上（例如頸部或胸部）抽取少量細胞組織化驗。針刺檢驗進行時，或會有少許痛楚，病人須遵從醫生的指示和合作。人體內部器官（如肺、肝等）的硬塊，會由放射診斷部的醫生藉著各種儀器如電腦素描機、超聲波機等正確定位後，抽取樣本化驗。

針刺檢驗或會進行數次，視乎所取的樣本是否足夠作病理診斷而定。

取得的樣本，經塗片、染色程序後，再由病理科醫生在顯微鏡下詳細分析，報告將直接送交主診醫生。

準備工作

1. 須簽署同意書。
2. 接受針刺檢驗前可適量進食。

檢驗後注意事項

病人須用手緊壓針刺部位止血。病人若感到不適，請即通知醫生。

常見風險及併發症

肺部針刺細胞檢驗後，可能引致流血或氣胸（空氣進入肺膜間）。氣胸可以自行消失，或需插入一導管抽出空氣。

備註

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料參考，可能發生的風險或併發症不能盡錄。個別病人的風險程度亦有不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。播道醫院保留一切刪改此單張之權利。如對本頁資料有查詢或意見，歡迎向醫護人員提出，以便跟進改善。

參考資料

Wikipedia: “*The Free Encyclopedia “Fine-needle aspiration” (2023)*
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-needle_aspiration (28-07-2023)