

簡介

1. 檢查喉部及鄰近組織
2. 活組織檢查
3. 透過喉鏡進行其他手術

適用情況

喉部及鄰近部位病變

預期裨益和結果

1. 改善發聲
2. 紓緩氣道阻塞
3. 採取活組織進行病理檢查
4. 切除病變
5. 有機會不能徹底清除病灶和有可能復發

手術不能解決的問題

功能性發聲障礙

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行。
2. 醫生會把喉鏡插入咽喉，以內窺鏡或顯微鏡進行檢查。
3. 然後再進行恰當的程序。

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫生將盡力減少副作用和併發症風險。

常見副作用和併發症

($\geq 1\%$ 風險)

1. 出血
2. 疼痛
3. 感染
4. 口咽組織損傷

不常見副作用和併發症

(<1% 風險)

1. 牙齒脫落、裂傷、疼痛
2. 顛頷關節損傷，引致疼痛、牙關緊閉和半脫臼
3. 聲音改變
4. 上呼吸道阻塞
5. 術後肺水腫
6. 頸椎損傷
7. 失去味覺（暫時或永久）
8. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

手術前準備

請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。

手術後須知

可能出現喉部不適，通常數日內會改善。你或需要休息聲帶避免發聲。

其他療法

1. 觀察病情進展，再作打算
2. 藥物治療
3. 言語治療
4. 放射治療或化療（惡性腫瘤）

不治療的後果

1. 無病理診斷
2. 病情惡化

手術後跟進

請依約期覆診

備註

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料參考，可能發生的風險或併發症不能盡錄。個別病人的風險程度亦有不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。播道醫院保留一切刪改此單張之權利。如對本頁資料有查詢或意見，歡迎向醫護人員提出，以便跟進改善。

參考資料

醫院管理局：《直接喉鏡 / 顯微喉鏡》(2023)

智友站：http://www.ekg.org.hk/pilic/public/ENT_PILIC/ENT_DirectLaryngoscopy_0120_engchi.pdf (06-07-2023)