

## 簡介

前庭大腺位於陰道口兩側，這些腺體會分泌出潤滑液以潤滑陰道。當腺管被阻塞引起炎症或囊腫內液體被細菌感染時，便會導致前庭大腺囊腫出現。急性發作期可能形成膿腫。袋形縫合術透過手術建造造袋以排出囊腫及膿腫內的液體或膿液，並預防囊腫再生。

## 手術過程

1. 手術會在局部或全身麻醉下進行。
2. 病人需保持「膀胱切石臥位姿勢」。
3. 於囊腫開出小切口，排出液體或膿液。
4. 將內囊壁被折回並縫合到皮膚上製造小袋形。

## 術前準備

1. 手術當日或前 1 天入院，依照「非緊急手術」程序。
2. 麻醉前檢查，請告知醫生任何藥物過敏史、常規用藥及重要病歷。
3. 手術前禁食 6-8 小時。
4. 在轉入手術室前須排尿清空膀胱，並換上手術服。
5. 可能須要接受麻醉前用藥、靜脈滴注、注射或口服抗生素預防感染。
6. 如有需要會安排剃除切口附近的體毛。

## 術後注意事項

### 一般事項

1. 插內喉管會引致喉部輕度不適。
2. 手術部位出現輕微不適或疼痛。如需要更多的鎮痛藥，請向護士查詢。
3. 如進行全身麻醉，一般會出現噁心或嘔吐的症狀。如症狀嚴重，應通知護士。
4. 手術後 6 個小時可活動或離床。

### 傷口護理

1. 應每天洗澡，並保持傷口清潔及乾爽。
2. 術後數星期，傷口可能會有少量出血或滲液。

### 飲食

麻醉後約 4 小時，可試飲用少量清水，無礙後可逐漸回復飲食。

## 常見手術風險及併發症（可能發生的併發症不能盡錄）

### 麻醉併發症

1. 心血管：心肌梗塞或缺血、中風、腳部深層靜脈血栓形成、肺栓塞等。
2. 呼吸系統：肺炎、哮喘發作、慢性阻塞性氣道疾病惡化。
3. 過敏反應及休克。

### 手術併發症

 感染 / 出血 / 再次形成囊腫

## 不接受手術的風險

囊腫可能產生併發症如出血及破裂。

## 出院後注意事項

1. 如出現傷口疼痛或紅腫加劇 / 傷口滲漏，請聯絡你的醫生或到就近的急症室求診。
2. 有必要時，服用醫生處方的鎮痛藥。
3. 數週內可能會有輕微陰道出血或分泌，請使用衛生棉墊（非衛生棉條）保持清潔。
4. 手術後 4 週可恢復性生活。
5. 手術後可如常洗澡，請勿浸浴、使用油性產品及爽身粉直至分泌物完全停止。
6. 傷口完全癒合前，請勿使用有香味的沐浴產品。
7. 病人應避免穿著緊身褲，直至傷口感到無痛。
8. 術後 2 星期內或傷口完全癒合前，請勿進行游泳活動。

### 備註

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料參考，可能發生的風險或併發症不能盡錄。個別病人的風險程度亦有不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。播道醫院保留一切刪改此單張之權利。如對本頁資料有查詢或意見，歡迎向醫護人員提出，以便跟進改善。

### 參考資料

Healthline: "What to expect from marsupialization" (2020)  
<https://www.healthline.com/health/marsupialization> (25-07-2023)