

簡介

經皮腎盂內外引流術手術目的是紓緩泌尿道阻塞。

手術過程

1. 手術是病人在局部麻醉和適量的鎮靜劑下進行。
2. 利用 X 光透視或超聲波定位進行腎盂穿刺，插入導管。
3. 病人需保持俯臥位置，醫生在其腰部施行穿刺。
4. 經導管注入顯影劑進行造影（順行性腎盂造影術），以確定阻塞之位置。
5. 在導線引導下，準確地將引流導管放置在阻塞之泌尿道內，將尿液引流到體外之引流袋，紓緩阻塞。
6. 視乎情況和可行性，醫生將考慮放置膠質支架紓緩長期性的阻塞。
7. 手術後，須回病房休息及接受觀察。如有不適，應立即告訴當值醫生或護士。

術前準備

1. 簽署手術同意書。
2. 病人如懷疑可能或已經懷孕，請事先通知放射科職員。
3. 檢查血凝結率，如有問題需要先矯正。
4. 手術前 4 - 6 小時要禁飲食。
5. 醫生會按情況處方預防性抗生素。
6. 預備靜脈注射部位。
7. 對於有過敏性反應記錄者，醫生會處方預防性類固醇。

常見手術風險及併發症（可能發生的併發症不能盡錄）

因手術而出現併發症（如出血、傷口感染）約為 4 至 6%，而死亡率則為 0.2%。

備註

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料參考，可能發生的風險或併發症不能盡錄。個別病人的風險程度亦有不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。播道醫院保留一切刪改此單張之權利。如對本頁資料有查詢或意見，歡迎向醫護人員提出，以便跟進改善。

參考資料

Medscape: “Percutaneous Nephrostomy” (2022)
<https://emedicine.medscape.com/article/1821504-overview?form=fpf> (25-07-2023)