

簡介

用補牙物料填補牙齒洞隙。兩種常用的物料是銀汞合金（俗稱銀粉）和合成樹脂（俗稱瓷粉）。

適應症

1. 蛀牙。
2. 牙齒耗損，受傷破裂。
3. 琺瑯質缺損。

治療效益

1. 紓緩痛楚或牙齒敏感性。
2. 預防 / 治療感染。
3. 修復功能和回復美感。
4. 修復牙齒輪廓，使日常口腔衛生護理更為有效。

手術過程

- A. 銀汞合金**
1. 有可能需要局部麻醉。
 2. 先清除蛀壞的部份，然後用銀汞合金充填牙洞。
 3. 修飾及打磨充填物。
- B. 合成樹脂**
1. 可能需要局部麻醉。
 2. 先清除蛀壞的部份或脆弱的琺瑯質。
 3. 用稀釋的酸液(例如 30% 磷酸)酸蝕牙齒表面，然後沖洗吹乾。
 4. 在已酸蝕的牙齒表面塗上黏固劑。
 5. 用複合樹脂充填牙洞，修補牙齒缺失部份。
 6. 用白光或藍光使合成樹脂凝固。
 7. 修飾及打磨充填物。

術前準備

病人應該告知牙醫其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物（例如薄血藥），包括中藥及保健食品。

術後注意事項

1. 若以銀汞合金補牙，24 小時內應避免用該牙齒嚼食。
2. 咖啡、茶及抽煙會使合成樹脂著色。若著色嚴重，需要更換補牙物料。
3. 新補牙齒可能比較敏感，應避用太熱或太冷的食物和飲品。若情況持續或惡化，便應約見牙醫作詳細檢查。
4. 如蛀牙較深，牙髓有可能在補牙前已受細菌感染。倘若出現突發性腫痛情況，應立即聯絡主診牙醫，可能需要進一步的治療。

常見手術風險及併發症

手術有一些副作用和併發症風險，牙醫將盡力減少其發生機會。

1. 牙齒敏感
2. 蛀牙復發
3. 補牙物料脫落

不常見而帶有嚴重後果的風險

（<1% 風險）急性牙髓炎

不治療的後果

1. 牙痛
2. 咀嚼及進食困難
3. 牙髓發炎
4. 牙周感染及膿瘡

手術後跟進

請依約期覆診

* 如非本院牙科診症時間，請致電本院門診服務（電話：2711 5222）或 到就近急症室求診。

* 「盈愛·笑容無障牙科服務」的病人請直接向主診牙醫查詢或求診 或 到就近急症室求診。

備註

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料參考，可能發生的風險或併發症不能盡錄。個別病人的風險程度亦有不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。播道醫院保留一切刪改此單張之權利。如對本頁資料有查詢或意見，歡迎向醫護人員提出，以便跟進改善。

參考資料

Cleveland Clinic: "Dental Fillings" (2021) <https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17002-dental-fillings> (03-08-2023)