

**簡介** 把牙齒從頤骨拔除

**適應症**

1. 蛀牙
2. 牙周病
3. 牙齒創傷/破裂
4. 配合牙齒矯正 / 修復治療

**治療效益**

1. 止痛
2. 預防 / 治療感染
3. 為牙齒修復及復康作好準備

**手術過程**

1. **非手術性脫牙** 用牙鉗握緊並搖鬆牙齒，把牙齒從牙槽骨中取出。
2. **手術性脫牙**
  - a. 在牙肉切口把牙肉翻起。
  - b. 除去覆蓋牙齒的牙槽骨，使牙齒外露。
  - c. 牙齒被剖開，然後取出。
  - d. 用手術線把傷口縫合。

**術前準備** 病人應該告知牙醫其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物，例如薄血藥，包括中藥及保健食品。

**術後注意事項**

1. 手術後可能需要服用止痛藥。
2. 脫牙後的3、4天內，脫牙旁邊的牙齒可能會感到輕微酸痛。
3. 手術後當天切勿吐口水或漱口，以免引致傷口出血。
4. 切勿用舌頭、手指或硬物擦弄傷口。
5. 不應吸煙，飲用含酒精成分飲品，或進食熱的食物和飲料。
6. 避免過重之體力勞動或劇烈運動。
7. 口水混有血絲是正常現象。

**常見手術風險及併發症** 手術有一些副作用和併發症風險，牙醫將盡力減少其發生機會。

1. 腫痛
2. 瘀青
3. 出血
4. 手術後傷口感染會阻延癒合，需要抗生素治療。
5. 牙根尖遺留
6. 鄰牙、補牙物料或牙肉受損傷。
7. 牙骹痛 - 通常是短暫性
8. 張口困難

**不常見而帶有嚴重後果的風險** (<1% 風險)

1. 嘴唇/面頰/舌頭/牙齒暫時或永久性麻痺。
2. 上頤臼齒脫除手術後可能有鼻竇炎或口腔上頤竇瘻，需要進一步治療。
3. 骨折，可能需要進一步治療。

**不治療的後果**

1. 蛀牙
2. 牙周病
3. 牙瘡及細菌感染

**手術後跟進** 請依約期覆診

\* 如非本院牙科診症時間，請致電本院門診服務（電話：2711 5222）或 到就近急症室求診。

\* 「盈愛·笑容無障牙科服務」的病人請直接向主診牙醫查詢或求診 或 到就近急症室求診。

**備註**

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料參考，可能發生的風險或併發症不能盡錄。個別病人的風險程度亦有不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。播道醫院保留一切刪改此單張之權利。如對本頁資料有查詢或意見，歡迎向醫護人員提出，以便跟進改善。

**參考資料**

Cleveland Clinic: "Tooth Extraction" (2021)

<https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22120-tooth-extraction> (03-08-2023)

☎ 2711 5222 ☎ 2760 3484

222 九龍亞皆老街 | info@evanhosp.org.hk  
Argyle Street, Kowloon | www.evangel.org.hk