

簡介 以外科手術方式將阻生牙齒（不能夠正常生長出來至理想咬合位置的牙齒）脫除。

適應症

1. 冠周炎。
2. 阻生牙引致鄰牙有蛀牙或牙周病。
3. 鄰牙萎縮。
4. 阻生牙牙囊病變。
5. 為牙齒矯正或義齒治療作準備。
6. 為正頷外科手術 / 骨折治療作準備。
7. 其他。

預期結果

1. 止痛。
2. 防治感染。
3. 為牙齒及口腔修復治療作準備。
4. 增加正頷外科手術 / 創傷後手術之成效。

手術過程

1. 切開牙肉，將牙齒外露。
2. 將包裹牙齒之牙槽骨移走。
3. 牙齒有需要時會被分割成幾部分移走。
4. 清潔牙槽及清除異物。
5. 用手術線縫合傷口。

術前準備

病人應告知牙醫其本身醫療情況，如心臟病、使用心臟起搏器、服用任何抗凝血藥物等。

術後注意事項

1. 口水會帶有血絲。
2. 面部腫脹。
3. 傷口疼痛 - 止痛藥可舒緩。
4. 保持良好口腔衛生有助傷口復完。
5. 首 2 至 3 天食用軟餐。

常見手術風險及併發症 手術有一些副作用和併發症風險，牙醫將盡力減少其發生機會。

1. 手術後傷口感染會阻延癒合，需要抗生素治療。
2. 出血。
3. 牙根尖遺留。
4. 鄰牙、補牙物料或牙肉受損傷。
5. 牙齦痛 - 通常是短暫性。

不常見的嚴重副作用及併發症 (<1% 風險)

1. 手術中可能傷及下齒槽神經及舌神經，引致下唇及舌頭麻痺。復完時間會較長。
2. 上頷臼齒脫除手術後可能會引發鼻竇炎或口腔上頷竇瘻，需要進一步治療。
3. 顎骨骨折
- 4.

不治療的後果

1. 阻生牙、冠周炎、牙囊病變。
2. 鄰牙萎縮、蛀牙或牙周病。

手術後跟進

請依約期覆診

* 如非本院牙科診症時間，請致電本院門診服務（電話：2711 5222）或 到就近急症室求診。

* 「盈愛·笑容無障牙科服務」的病人請直接向主診牙醫查詢或求診 或 到就近急症室求診。

備註

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料參考，可能發生的風險或併發症不能盡錄。個別病人的風險程度亦有不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。播道醫院保留一切刪改此單張之權利。如對本頁資料有查詢或意見，歡迎向醫護人員提出，以便跟進改善。

參考資料

Cleveland Clinic: "Tooth Extraction" (2021)
<https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22120-tooth-extraction> (03-08-2023)